



Casi clinici interattivi – Tutorial

I casi clinici interattivi permettono di simulare il percorso di gestione del paziente, svolgendo le diverse attività clinico diagnostiche. Per avviare il caso clinico seleziona il pulsante INIZIA.



Le prime pagine presenteranno un'introduzione del caso clinico, descrivendo lo scenario iniziale.



Se desideri, utilizzando i pulsanti AUDIO puoi ascoltare il dialogo tra i personaggi.

Contatto telefonico - Settembre 2019

MD Luisa: Buongiorno Laura, tutto bene a casa?

Laura: Buongiorno dottoressa, a casa tutto bene, la contatto per mia figlia Silvia.

MD: Mi dica, come posso esserle utile?



INDIETRO AVANTI

Speaker icon Mute icon

Dopo l'introduzione puoi interagire con il paziente, svolgendo le diverse attività cliniche, dall'anamnesi alle indicazioni terapeutiche, utilizzando il menu visualizzato. Al termine delle attività premi il pulsante Concludi per procedere alla prossima visita.

Contatto Telefonico

Come procedi?


Anamnesi ed esame obiettivo	Analisi di laboratorio	Analisi strumentali	Indicazioni terapeutiche ed invio
-----------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------

CONCLUDI IL CONTATTO E VAI ALLA PROSSIMA VISITA


Per svolgere le attività è sufficiente selezionare le opzioni desiderate e quindi premere il pulsante conferma: in base alle scelte effettuate il sistema offrirà le informazioni utili a proseguire il caso.



In alcuni momenti, dovrai rispondere a domande e quesiti: dopo aver confermato le tue scelte, il sistema ti darà un feedback, indicando se la risposta scelta è corretta o meno.



Al termine delle attività il commento dell'esperto scientifico descriverà la corretta soluzione del caso clinico, riportando le evidenze scientifiche tratte dalla letteratura internazionale.



Commento dell'esperto

Per questo spesso i pazienti vengono etichettati come bambini/ragazzi molto "vivaci" che poi hanno "messo la testa a posto", non fratturandosi più.

Il rischio di frattura poi dopo i 35-40 ricomincia ad aumentare progressivamente con il passare degli anni, in genere sempre come conseguenza di traumi normalmente "non efficienti".

INDIETRO AVANTI

Speaker icon Mute icon